

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Peter WERLE, et al.

SERIAL NO: 09/982,240

FILED: October 19, 2001

FOR: WATER-SOLUBLE, CHLORHEXIDINE-CONTAINING COMPOSITIONS AND USE THEREOF

GAU:

EXAMINER:



REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
GERMANY	100 52 322.6	OCTOBER/21/2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ is submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Corwin Paul Umbach

Norman F. Oblon
Registration No. 24,618

Corwin P. Umbach, Ph.D.
Registration No. 40,211



22850



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 100 52 322.6

Anmeldetag: 21. Oktober 2000

Anmelder/Inhaber: Degussa AG, Düsseldorf/DE
(Vormals: Degussa-Hüls AG, Frankfurt/DE)

Bezeichnung: Wasserlösliche chlorhexidinhaltige Zusammen-
setzungen und deren Verwendung

IPC: A 01 N 47/44

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 12. Oktober 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Holß

Wasserlösliche chlorhexidinhaltige Zusammensetzungen und deren Verwendung


Beschreibung

- 5 Die Erfindung betrifft wasserlösliche chlorhexidinhaltige Zusammensetzungen und deren Verwendung. Die Zusammensetzung enthält Chlorhexidin in Form der freien Base oder in Form eines Chlorhexidin-disalzes.

- 10 Chlorhexidin (CHD), chemisch als 1,1'-Hexamethylen-bis-[5.4.chlorphenyl]-biguanid anzusprechen, ist eine stark basisch wirkende Substanz mit nur sehr geringer Wasserlöslichkeit. Durch Umsetzung der Chlorhexidinbase mit Säuren ist eine Vielzahl von ebenfalls schwer wasserlöslichen Salzen zugänglich; wasserlöslich sind
15 dagegen einige Salze von Chlorhexidin mit Zuckersäuren. Chlorhexidinbase und vor allem das wasserlösliche Chlorhexidindigluconat, ein Salz der D(+)-Gluconsäure mit Chlorhexidin stellen bedeutende antibakterielle Substanzen dar, sowohl für den Einsatz im Human- als auch im
20 Tierbereich. Hervorzuheben sind die niedrige Toxizität und Verträglichkeit mit kationischen und nichtionischen Detergentien. Chlorhexidindigluconat (CHD-gluc) ist als 20 gew.-%ige wässrige Lösung im Handel erhältlich. Flüssige chlorhexidinhaltige Formulierungen werden vielfältig
25 modifiziert und als antibakterieller Zusatz in Kosmetika, zur Hautdesinfektion, Wundbehandlung, in der Veterinärmedizin als Euterdesinfektionsmittel und auch zur Oberflächendesinfektion eingesetzt.

- Die CHD-Gluconatlösungen unterliegen in ihrer
30 Zusammensetzung und Erscheinung den Anforderungen des Europäischen Arzneibuches bzw. der amerikanischen Pharmakopoe. Eine der Reinheitsforderungen ist der auf 500 ppm begrenzte Gehalt an p-Chloranilin. In Umkehrung der

Bildung von CHD (= CHD-Base) aus
Hexamethylenbiscyanoguanidin und p-Chloranilin gemäß
nachfolgender Gleichung



- 10 kann bei der Salzbildung der CHD-Base mit D(+) Gluconsäure-
δ-lacton, dem inneren Ester der D(+)-Gluconsäure, in
wässriger Phase sowie beim Stehenlassen, also Lagern dieser
Lösungen, p-Chloranilin reversibel abgespalten werden. Mit
zunehmender Lagerzeit kommt es zur Verfärbung der Lösungen
15 in den gelb bis bräunlichen Bereich. Diese Zersetzung von
Chlorhexidindigluconatlösungen ist abhängig vom pH-Wert der
Lösung und vor allem der Lagertemperatur. Untersuchungen
zeigten, dass bei einer Lagerung einer 20 gew.-%igen Lösung
Chlorhexidindigluconat bei 40 °C nach etwa einem Monat die
20 zulässigen p-Chloranilinwerte überschritten werden. Auch
vielfach verwendete Lösungen, welche CHD-digluconat und
andere mikrobiozid wirksame Stoffe enthalten, unterliegen
in unterschiedlichem Ausmaß dieser Hydrolyse.

- Eine vielfach verwendete Kombination enthält
25 Chlorhexidindigluconat und N-Cetyl-N,N,N-
trimethylammoniumbromid (Cetrimide) als Aktivsubstanzen in
verdünnten wässrigen oder alkoholischen Lösungen. Auch
solche Lösungen weisen eine ungenügende Lagerstabilität
auf. Chlorhexidin oder ein Salz davon und Cetrimide oder
30 ähnliche Mikrobiozide enthaltende feste Zusammensetzungen,
die in Wasser klar löslich und auch bei höherer

Lagertemperatur in sich stabil sind, sind bislang nicht bekannt. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit die Bereitstellung derartiger biozider Mischungen, aus denen durch Versetzen mit Wasser gebrauchsfertige Lösungen
5 gewonnen werden können.

Gegenstand der Erfindung ist eine wasserlösliche chlorhexidinhaltige pulver-, granulat- oder tablettenförmige Zusammensetzung, bestehend im wesentlichen aus
10 (i) einem Salz von Chlorhexidin mit 2 Mol einer Zuckersäure und einem mikobiozid wirksamen quaternären Ammoniumbromid oder aus
(ii) Chlorhexidin, einer Zuckersäure oder Zuckerlacton, wobei pro Mol Chlorhexidin mindestens 2 Mol Zuckersäure
15 oder Zuckerlacton anwesend sind, und einem mikrobiozid wirksamen quaternären Ammoniumbromid.

Die Unteransprüche richten sich auf bevorzugte Ausführungsformen, insbesondere auf Zusammensetzungen auf der Basis von im wesentlichen Chlorhexidindigluconat und
20 Cetrimide oder Chlorhexidin, Gluconsäure oder Gluconolacton und Cetrimide.

Es wurde gefunden, dass sich ein Gemisch aus festem pulverförmigen Chlorhexidindigluconat und Cetrimide in verschiedenen Verhältnissen, wobei das Gemisch bei Bedarf
25 in eine für die Anwendung geeignete, z. B. granuliert, tabellierte oder pelletisierte Form, überführt worden sein kann, überraschenderweise in Wasser rückstandsfrei wieder auflöst und die Herstellung gebrauchsfertiger oder weiter verdünnbarer Lösungen erlaubt. Dieser Befund war
30 unerwartet, da es in einer Chlorhexidindigluconatlösung in Gegenwart von Bromid-Ionen häufig zur Ausfällung von in Wasser schwer löslichem Chlorhexidindibromid kommt.

Aus dem Löslichkeitsprodukt für Chlorhexidindibromid von $L = 9,3 \times 10^{-8} \text{ mol}^3/\text{l}^3$ können Grenzkonzentrationen für die in

der Lösung vorliegenden Spezies, diprotoniertes Chlorhexidin (= CHD-dikation), Bromid-Ion und Chlorhexidindibromid (= CHD-dibromid) berechnet werden. Eine gesättigte Chlorhexidinbromidlösung sollte danach pro

5 1 ca. 1400 mg Chlorhexidin-dikation und 450 mg Bromid-Ionen enthalten. Mischungen aus festem Chlorhexidindigluconat und Bromid-Ionen enthaltenden Stoffen, wie Cetrimide, sollten sich daher nur beschränkt in Wasser lösen, bzw. bei Ionen-

10 Konzentrationen, die die durch das Löslichkeitsprodukt festgelegten Höchstwerte überschreiten, zu Ausfällungen führen. Überraschend aber wurde gefunden, daß feste Mischungen aus Chlorhexidindigluconat und Cetrimide sich in Wasser klar auflösen, ohne dass eine zu erwartende Fällung von CHD-dibromid auftritt, wenn das Löslichkeitsprodukt

15 überschritten wird.

Erfindungsgemäße Zusammensetzungen enthalten als Chlorhexidinsalz ein Salz einer Zuckersäure, wobei das Salz aus dem diprotonierten Chlorhexidin-dikation und zwei Säureanionen der Zuckersäure besteht. Außer dem lange

20 bekannten Chlorhexidindigluconat sind derartige Salze in der EP 1 018 337 A2, deren Offenbarung in diese Anmeldung einbezogen wird, beschrieben. Bevorzugte Salze enthalten das Anion der Gluconsäure, insbesondere der D(+)-

25 Gluconsäure, der Lactobionsäure, D-Galactonsäure, L-Mannonsäure, D-Galacturonsäure, D-Gulonsäure und α -D-Heptagluconsäure. Alternativ hierzu kann die Zusammensetzung anstelle eines Chlorhexidinsalzes eine Kombination aus Chlorhexidin (freie Base) und einer Zuckersäure, wie den zuvor genannten, oder Lacton einer

30 solchen, wie D-Galacton- γ -lacton, L-Mannonsäure- γ -lacton, D-Gulonsäure- γ -lacton, D-Gluconolacton, α -D-Heptagluconsäure- γ -lacton, enthalten, wobei pro Mol CHD-Base im allgemeinen mindestens zwei Mol Säure oder Lacton anwesend sind, ein Säure- oder Lactonüberschuss,

35 beispielsweise bis 100 %, insbesondere bis 20 %, aber

möglich ist. Derartige Kombinationen bilden beim Auflösen in Wasser CHD-Salze.

Unter den mikrobiozid wirksamen quaternären Ammoniumbromiden sind solche Verbindungen zu verstehen, 5 welche mindestens einen mittel- bis langkettige Alkyl- oder Alkenylrest mit 8 bis 18 C-Atomen aufweisen und bis zu drei gleiche oder verschiedene kurzkettige Alkylreste, die ihrerseits zusätzlich eine Hydroxyl- und/oder Halogengruppe oder/und eine Epoxidgruppe enthalten können. Insbesondere 10 handelt es sich um (C₁₀ bis C₁₆)Alkyl-tri(C₁ bis C₃)alkylammoniumbromid, besonders bevorzugt um N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, das unter der Bezeichnung Cetrimide als mikrobiozide Aktivkomponente breite Anwendung in Desinfektionsmitteln findet.

15 Unter dem Begriff „chlorhexidinhaltig“ wird verstanden, dass die Zusammensetzung Chlorhexidin in Form der freien Base oder in Form eines Chlorhexidinsalzes, das seinerseits das diprotonierte Chlorhexidindikation aufweist, enthält.

Der Begriff „im wesentlichen“ schließt übliche Hilfsstoffe 20 für mikrobiozide Formulierungen ein. Beispiele hierfür sind oberflächenaktive Stoffe, Tablettensprengmittel, Granulierungsmittel und Lösungsvermittler. Derartige Hilfsstoffe können in einer Gesamtmenge von bis zu 20 Gew.-%, insbesondere weniger als 10 Gew.-% und vorzugsweise bis 25 zu 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Summe der Biozide in der Zusammensetzung, enthalten sein.

Das Gewichtsverhältnis der mikrobioziden Aktivkomponenten ist hierbei beliebig. Üblicherweise enthalten die 30 erfindungsgemäßen Zusammensetzungen Chlorhexidin in Form der freien Base oder des diprotonierten Dikations und ein mikrobiozid wirksames quaternäres Ammoniumbromid, wie Cetrimide, im Gewichtsverhältnis im Bereich von 1:2 bis 1:20, insbesondere im Bereich von 1:5 bis 1:20, jedoch kann

auch Chlorhexidin oder ein Salz davon gegenüber dem Ammoniumbromid im Überschuss vorliegen.

Ein vollständig wasserlösliches 1:1 Chlorhexidingluconat-Cetrimide-Gemisch kann nach Auflösung in Wasser bis zu etwa
5 6 Gew.-% Cetrimide enthalten, da die tolerierbare Cetrimidekonzentration durch die beschränkte Cetrimide-Wasserlöslichkeit (ca. 67 g/l) limitiert wird. Bei einem Mischungsverhältnis von CHD bzw. dem Dikation eines Salzes zu Cetrimide wird mit zunehmendem Cetrimide-Gehalt die in
10 Lösung erreichbare CHD-Konzentration entsprechend erniedrigt. Bei einem Gewichtsverhältnis von 1:20 lassen sich daher klare Lösungen nur mit einem Gehalt von etwa 0,6 % CHD-dikation herstellen, da ansonsten Cetrimide ungelöst verbleibt. Höher konzentrierte Lösungen können aber durch
15 Zusatz von Alkoholen hergestellt werden.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung richtet sich auf ein Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer Zusammensetzungen. Chlorhexidin und eine Zuckersäure oder Lacton davon werden in einem zur Disalzbildung
20 ausreichenden Molverhältnis, das heißt, 1 zu mindestens 2, mit dem quaternären Ammoniumbromid, wie insbesondere Cetrimide, gemischt. Chlorhexidin und das Ammoniumbromid werden vorzugsweise im Gewichtsverhältnis im Bereich von 1:2 bis 1:20, insbesondere 1:5 bis 1:20, eingesetzt.
25 Zweckmäßigerweise liegen alle Einsatzstoffe bereits pulverförmig vor. Das Mischen kann auch ein Mahlen umfassen. Beim oder nach dem Mischen oder Mahlen kann das pulverförmige Gemisch granuliert, pastilliert oder tablettiert werden, wobei ggf. übliche Granulierhilfsmittel
30 und/oder Tablettensprengmittel zusätzlich eingesetzt werden. Anstelle der Kombination aus Chlorhexidin und einer Zuckersäure oder Lacton davon kann ein daraus gebildetes Chlorhexidinsalz eingesetzt werden. Vorzugsweise werden Chlorhexidindigluconat und Cetrimide im Gewichtsverhältnis
35 von 1:1 bis 1:10 eingesetzt.

Ein technisch gangbarer Weg zur Herstellung von pulverförmigem Chlorhexidindigluconat oder anderen Chlorhexidinsalzen von Zuckersäure besteht in der Abkühlung einer 20 bis 40 gew.-%-igen wässrigen Lösung des Salzes, auf
5 Temperaturen von -50 bis -80 °C und Entfernen des Wassers durch Hochvakuumsublimation.

Cetrimide ist als Feststoff käuflich zu erwerben. Die Vermischung beider Komponenten erfolgt durch Homogenisieren in geeigneten Apparaturen.

- 10 Bei Verwendung von Chlorhexidinbase (a), einem Zuckersäurelacton (b), wie δ -Gluconolacton, und Cetrimide, ist eine Vormischung oder Salzbildung der Komponenten a und b nicht notwendig. Im richtigen Verhältnis eingesetzt, wird auch hier ein Pulver, das sich in Wasser löst, erhalten.
- 15 Wegen der notwendigen Reaktionszeit der Base und der Dauer der Hydrolyse des Lactons zur freien Säure, benötigen derartige Systeme aber eine längere Lösezeit.

- Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen lassen sich zur Herstellung wässriger oder wässrig-organischer
20 Desinfektionsmittellösungen verwenden. Solche Lösungen können die fertige Anwendungskonzentration an beiden biozid wirksamen Komponenten enthalten oder vor der Anwendung noch weiter verdünnt werden.

- Wesentliche Vorteile der erfindungsgemäßen Zusammensetzung
25 sind:

- ❖ Die hohe Lagerstabilität, da das die Stabilität beeinträchtigende Wasser erst vor der Anwendung zugesetzt wird.
- ❖ Die leichte Zugänglichkeit und Variationsfähigkeit der
30 Zusammensetzungen.

- ❖ Die leichte Verfügbarkeit von Desinfektionsmittellösungen mit unterschiedlichem Wirkstoffgehalt.

5 Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher beschreiben:

Beispiel 1

Herstellung von festem Chlorhexidindigluconat

200 g einer 20 %igen (100 g einer 40 %igen) Chlorhexidindigluconatlösung werden in einem 1 l Kolben
10 vorgelegt und in einem Gemisch aus festem Kohlendioxid in Ethanol ausgefroren. Die ca. -78 °C kalte, kristalline Masse wird anschließend an einer Hochvakuumsublimationsapparatur vom Wasser befreit. Chlorhexidingluconat hinterbleibt als völlig farbloses, pulverförmiges Produkt.
15 Restwassergehalt < 1 %. Beim Erwärmen beginnt es ab ca. 60 °C stark zu sintern, eine klare Schmelze liegt bei 85 bis 90 °C vor.

Beispiele 2 bis 4

Gemäß den Beispielen 2a bis 4a wurden aus
20 Chlorhexidindigluconat und Cetrimide Chlorhexidindigluconat (= CHD-gluc) / Cetrimide Mischungen in den Verhältnissen 1:1, 1:5 und 1:10 hergestellt. Die Feststoffe wurden in Schraubgläser eingewogen und anschließend 30 Minuten homogenisiert.
25 Anstelle von festem CHD-digluconat wurde in den Beispielen 2b bis 4b eine Mischung aus CHD-Base und δ -Gluconolacton verwendet.

Beispiel	CHD-gluc [g]	Cetrimide [g]	CHD-Base [g]	δ -Glucolacton [g]
2a	15	15	-	-
2b	-	15	10.9	4.1
3a	15	75	-	-
3b	-	75	10.9	4.1
4a	15	150	-	-
4b	-	150	10.9	4.1

Beispiel 5

5 Lösungen der Mischungen der Zusammensetzungen der Beispiele 2b bis 4b wurden durch Einbringen der gewünschten Menge an Aktivsubstanz in Wasser hergestellt. Die nachfolgende Tabelle gibt die Lösezeiten zur Herstellung von Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen wieder.

Konzentration CHD-gluconat [%]	Lösezeit in Minuten					
	Mischungsverhältnis (CHD-Base+ δ -Gluconolacton) : Cetrimide					
	1 : 1		1 : 5		1 : 10	
	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C
0.5	50-60	14-18	60	8-10	75	7
1	35-40	10-14	200	10-14	240	14
5	25-30	8-10	-	-	-	-

10

Bei Verwendung von festem, durch Gefriertrocknung gewonnenem, CHD-digluconat verkürzen sich die Lösezeiten wesentlich. Sie liegen bei Raumtemperatur im Bereich von

etwa 5 Minuten, wobei die Lösezeit durch die Lösegeschwindigkeit der Cetrimide-Komponente bedingt ist.

Bei Konzentrationen von 1.0 % CHD-digluconat in der Lösung und einem CHD-digluconat/Cetrimide-Verhältnis von 1:1

5 liegen in der Lösung 10 g CHD-gluconat bzw. 5630 mg CHD-Base sowie 2090 mg Bromid-Ionen vor. Trotzdem tritt keine Ausfällung von CHD-dibromid ein. Ein Zusatz von Alkoholen (n-Propanol; Isopropanol; Ethanol) im Bereich von 1 bis 2 % wirkt stabilisierend. Eine solche Stabilisierung ist bei
10 höheren Wirkstoffkonzentrationen und tiefer Lagertemperatur zweckmäßig. Die erfindungsgemäßen festen, vorzugsweise pulver-, tabletten- oder granulatförmigen Mischungen sind lagerstabil und spalten auch bei höheren Temperaturen kein p-Chloranilin ab.

15 **Beispiel 6**

Die Tabelle gibt einen Vergleich der p-Chloranilin-Abspaltung in der erfindungsgemäßen festen Mischung aus CHD-digluconat und Cetrimide im Gewichtsverhältnis 1:1 bei
20 40 °C Lagertemperatur und einer 4 %igen wässrigen Lösung hiervon.

Lagerdauer	Pulver	Lösung
Start	< 10	< 10
1 Monat	< 10	23
3 Monate	< 10	38
6 Monate	< 10	55

Patentansprüche

1. Wasserlösliche chlorhexidinhaltige pulver-, granulat- oder tablettenförmige Zusammensetzung, bestehend im wesentlichen aus
 - (i) einem Salz von Chlorhexidin mit 2 Mol einer Zuckersäure und einem mikrobiozid wirksamen quaternären Ammoniumbromid oder aus
 - (ii) Chlorhexidin, einer Zuckersäure oder Zuckerlacton, wobei pro Mol Chlorhexidin mindestens 2 Mol Zuckersäure oder Zuckerlacton anwesend sind, und einem mikrobiozid wirksamen quaternären Ammoniumbromid.
2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie als mikrobiozid wirksames quaternäres Ammoniumbromid N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium (Cetrimide) enthält.
3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie Chlorhexidin in Form der Base oder des diprotonierten Dikations eines Chlorhexidinsalzes und Cetrimide im Gewichtsverhältnis im Bereich von 1 zu 2 bis 1 zu 20, insbesondere 1 zu 5 bis 1 zu 20, enthält.
4. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie im wesentlichen aus Chlorhexidindigluconat als Chlorhexidinsalz und Cetrimide als mikrobiozid wirksames quaternäres Ammoniumbromid besteht.
5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie im wesentlichen aus Chlorhexidin und δ -Gluconolacton, welche im Molverhältnis von 1 zu 2 bis 1 zu 2,2 anwesend sind, und Cetrimide besteht.

6. Verfahren zur Herstellung einer chlorhexidinhaltigen Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass man Chlorhexidin und eine Zuckersäure oder Zuckerlacton in zur Disalzbildung ausreichenden Menge oder ein Disalz von Chlorhexidin mit einer Zuckersäure und ein mikrobiozid wirksames quaternäres Ammoniumbromid, jeweils in Pulverform, in einer Menge bis zu 10 Gewichtsteilen, bezogen auf 1 Gewichtsteil Chlorhexidin mischt und/oder miteinander vermahlt und, sofern erwünscht, das Pulvergemisch granuliert oder tablettiert.
7. Verwendung einer chlorhexidinhaltigen Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 oder hergestellt nach dem Verfahren gemäß Anspruch 6 zur Herstellung einer wässrigen oder wässrig-organischen, ein Salz von Chlorhexidin mit einer Zuckersäure und ein mikrobiozid wirksames quaternäres Ammoniumbromid enthaltenden Desinfektionsmittellösung.

**Wasserlösliche chlorhexidinhaltige Zusammensetzungen und
deren Verwendung**

Zusammenfassung

- 5 Die Erfindung betrifft lagerstabile wasserlösliche chlorhexinhaltige Zusammensetzungen. Die Zusammensetzungen sind pulver-, granulat- oder tablettenförmig und bestehen im wesentlichen aus
- 10 (i) einem Salz von Chlorhexidin mit 2 Mol einer Zuckersäure und einem mikrobiozid wirksamen quaternären Ammoniumbromid oder aus
- (ii) Chlorhexidin, einer Zuckersäure oder Zuckerlacton, wobei pro Mol Chlorhexidin mindestens 2 Mol Zuckersäure oder Zuckerlacton anwesend sind, und einem mikrobiozid
- 15 wirksamen quaternären Ammoniumbromid.

Bevorzugte Zusammensetzungen bestehen im wesentlichen aus Chlorhexidindigluconat und N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid (Cetrimide) im Gewichtsverhältnis 1 zu 1 bis 1 zu 10.

- 20 Die festen Zusammensetzungen sind wasserlöslich und spalten bei der Lagerung kein p-Chloranilin ab.